

SOCIEDAD

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

España suspende dos semanas la vacunación con AstraZeneca

La detección de once casos en la UE de un tipo de trombosis muy poco frecuente precipita la decisión de Sanidad, que se suma a las adoptadas por Alemania, Francia e Italia

JESSICA MOUZOU, Barcelona

Parón en Europa a la inmunización contra la covid con la vacuna de AstraZeneca. Después de que Dinamarca, Noruega, Islandia, Países Bajos e Irlanda suspendieran la administración del fármaco tras detectar varios casos de trombos —coágulos en la sangre— en personas vacunadas con este medicamento, España, Alemania, Francia e Italia se sumaron ayer a esta suspensión de las inmunizaciones con la vacuna de la compañía anglosueca hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aclare si el fármaco está relacionado o no con los episodios trombóticos detectados. La EMA, por su parte, mantiene la investigación abierta y dictará una resolución el jueves, aunque insiste en que los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos.


La alerta por varios casos en Europa de un tipo de trombosis muy poco frecuente en personas recientemente vacunadas provocó ayer el giro de timón del Ministerio de Sanidad, hasta ahora defensor de continuar con la vacunación pese al parón de Dinamarca o Noruega. "El fin de semana ha cambiado la valoración del riesgo. Del sábado al domingo tuvimos conocimiento de un caso de trombosis venosa cerebral, en concreto una trombosis de senos venosos, que cursaba con una disminución de plaquetas, lo que implica una activación irregular de coagulación. Afortunadamente, se está recuperando, pero ese mismo día supimos de tres casos del mismo estilo en Noruega, y Alemania también había identificado cuatro casos", explicó ayer María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, tras la reunión de urgencia del Consejo Interterritorial de Salud. "Nos parecía que esta acumulación de casos de esta trombosis tan concreta y específica se merece una valoración adicional".

En apenas una semana, parte de la estrategia de vacunación en Europa ha saltado por los aires. Al menos, temporalmente. Austria dio la primera señal de alerta el pasado martes al suspender la administración de un lote por la sospecha de que podría haber causado una embolia pulmonar a una persona y la muerte a otra diagnosticada de trombosis múltiple tras ser vacunada. Dos días después, Dinamarca iba un paso más allá y suspendió toda la vacunación con las dosis de AstraZeneca. Y tras ella, el goteo de países que paran no ha cesado.

La EMA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistían en que eran muy pocos casos y no estaba probada la relación causal. De hecho, hasta el 10 de marzo, solo se habían notificado 30 casos de episodios tromboembólicos tras adminis-

Casos confirmados en España


Actualizado con los datos del Ministerio de Sanidad de ayer



* Hasta el 26 de abril el Ministerio incluye los test de anticuerpos en los positivos. El 25 de mayo, hizo un reajuste para evitar casos duplicados. Cataluña eliminó casos duplicados el 2 de marzo de 2021.

Tasa de incidencia

Casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días



Fuente: Ministerio de Sanidad y elaboración propia

Las muertes semanales caen a la mitad

El descenso sostenido en la incidencia desde el pico de esta última ola se refleja en que las defunciones notificadas por covid en siete días han pasado de 1.926 a 988 en una semana. En total el informe de ayer recoge 72.424 fallecimientos por coronavirus.

En cambio, el ritmo del descenso de los contagios se ha estabilizado, como admitió ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

tras cerca de cinco millones de dosis en la UE, aseguraba la EMA. España mantenía el mismo discurso, pero la detección de esos casos de trombosis tan concretos y poco frecuentes, dieron una vuelta de tuerca a su valoración del riesgo.

"Son muy pocos casos en número absoluto, pero por importancia cualitativa de cada uno de

(CCAES), Fernando Simón, quien expuso que en estos momentos no está claro el devenir de esa estabilización, esa "meseta" en la curva de casos. Simón no ha descartado que haya repuntes. El informe de ayer incorporó 11.358 nuevos diagnósticos, para un acumulado en un año de 3.195.062.

La curva del valor tomado para el conjunto de España sigue descendiendo, aunque sea poco a poco. Pero en los datos de ayer se ve que esos repuntes van en aumento si se toman los datos de cada territorio.

Sin embargo, aunque la variación sea mínima, la incidencia de contagiados en 14 días por 100.000 habitan-


ellos y como en la población general también hay muy pocos casos de trastornos de la coagulación, nos parece prudente parar", justificó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Según Sanidad, entre los seis millones de dosis administradas en la Unión Europea, se han detectado 11 casos de este tipo de trombosis venosa cerebral. Darias aseguró ayer que

Evolución diaria

Cada barra representa la media diaria en los últimos siete días



Fallecidos



Por comunidades autónomas



tes ya ha bajado de 130, y está en 128,97. Para dar idea del frenazo en esta bajada, en los últimos siete días este indicador ha caído en 10,12 puntos: la semana anterior descendió en 20,49 unidades; la previa, en 50,23.

Los lunes son días con datos en los que influye la actividad de los hospitales durante el fin de semana. Esa puede ser la razón de la ligerrísima subida de la ocupación de camas hospitalarias. Desde el viernes este porcentaje ha pasado del 6,81 al 6,94%. Las UCI siguen mejorando. Dedicar el 21,04% de las plazas a personas con covid; hace una semana este porcentaje estaba en el 23,24%. / E. B. B.

se parará la vacunación durante dos semanas a la espera de que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA tome una decisión, prevista para este jueves. La ministra no concretó si el parón tendrá un impacto en los objetivos globales de vacunación —llegar a final del verano con el 70% de la población inmunizada— ni tampoco en las per-

sonas que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca. "Hay tiempo", ha dicho Darias, para organizar la administración de la segunda dosis si hay una resolución favorable de la EMA, ya que el período entre las inyecciones puede ser de hasta 10 y 12 semanas.

Con todo, la ministra hizo ayer un llamamiento a la calma e insistió en que, por ahora, el vínculo entre la vacuna y los trombos es "temporal", no causal. En España, donde ya la semana pasada cinco comunidades autónomas apartaron cautelosamente parte de uno de los lotes de vacunas investigados, se han administrado 939.534 dosis de AstraZeneca.

Como en España, el principio de prudencia ha precipitado la decisión de más países europeos de parar la vacunación con el fármaco de AstraZeneca. "Por recomendación del ministro de Sanidad, y en vínculo con las autoridades sanitarias francesas, se ha adoptado la decisión, de conformidad con nuestra política europea, de suspender, por precaución, la vacunación con AstraZeneca, esperando retomarla rápido si lo permite el dictamen de la agencia europea del medicamento", apuntó ayer el presidente francés, Emmanuel Macron. Por su parte, el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, aseguró que tomar la decisión de parar la vacunación "no ha sido fácil". "Es una medida puramente preventiva" que permitirá a los expertos revisar cuidadosamente las incidencias, señaló Spahn.

Seguridad

La Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) también anunció ayer que se sumaba a la decisión después de que en Sicilia fallecieron dos personas que habían recibido la vacuna, aunque estos casos aún están siendo investigados por la justicia. El Ministerio de Sanidad de Italia explicó en una nota que "actualmente no existe una correlación directa con las muertes reportadas".

Ante la situación, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA, el órgano encargado de supervisar la seguridad de los medicamentos ya aprobados, se reunirá hoy para proseguir con la investigación y ha convocado una reunión extraordinaria este jueves para adoptar las conclusiones oportunas con la información recopilada.

"El número de eventos tromboembólicos en general en las personas vacunadas no parece ser mayor que el observado en la población general", insistió ayer la EMA en un comunicado. El órgano europeo mantiene, al igual que la OMS, la opinión de que los beneficios de la vacuna superan los riesgos de efectos secundarios. "Las tasas en las que se producen trombos entre los vacunados son más bajas incluso que entre la población general. Ningún medicamento es 100% seguro, pero hay que tener en cuenta los beneficios de vacunar a la población contra una enfermedad que sabemos que está matando a millones de personas en todo el mundo", apuntó Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS.