醫院標誌       健康檢查證明應檢查項目表(乙表)         Hospital's       (醫院名稱、地址、電話、傳真機)         Logo       ITEMS REQUIRED FOR HEALTH CERTIFICATE (Form B)         (Hospital's Name, Address, Tel, FAX)	檢查日期// (年)(月)(日 // (M)(D)(Y Date of Examination
基本資料 (BASIC DATA)	
姓名:       性別:       □男 Male □女 Female         身份證字號           ID No.       :          出生年月日       /       /         Date of Birth       /       /         年齡       勝絡電話          Age       :	照片 Photo
實驗室檢查(LABORATORY EXAMINATIONS) A. HIV 抗體檢查 (Serological Test for HIV Antibody):	
<ul> <li>□陽性 (Positive) □陰性 (Negative) □未確定 (Indeterminate)</li> <li>a.篩檢 (Screening Test): □EIA □PA □其他 (Others)</li> <li>b.確認 (Confirmatory Test): □Western Blot □其他 (Others)</li> <li>□兒童 15 歲以下免驗 (Not required for children under 15 years of age)</li> <li>B. 胸部 X 光檢查肺結核 (Chest X-Ray for Tuberculosis):</li> <li>X 兆發現 (Findings):</li> </ul>	
<ul> <li>X 光發現(Findings):</li> <li>判定(Results):</li> <li>□合格(Passed) □疑似肺結核(TB Suspect) □無法確認診斷(Pending)</li> <li>(經臺灣健檢醫院判定為疑似肺結核或無法確認診斷者,得至指定機構複驗;在構者,得至鄰近醫院之胸腔科門診複檢。) (Those who are determined to be TB s pending diagnosis by the designated hospital in Taiwan must visit the referred institu evaluation.)</li> <li>□孕婦或兒童 12 歲以下免驗 (Not required for pregnant women or children under</li> </ul>	旦所在縣市無指定機 suspects or have a ition for further
<ul> <li>C.腸內寄生蟲(含痢疾阿米巴等原蟲)糞便檢查(採用離心濃縮法檢查)(Stool examincludes Entameba histolytica etc.) (centrifugal concentration method):</li> <li>□陽性,種名(Positive, Species) □ □陰性(Negative)</li> <li>□其他可不予治療之腸內寄生蟲(Other parasites that do not require treatment) □</li> <li>□兒童6歲以下或來自特定地區者免驗(Not required for children under 6 years of from designated areas as described in Note 6)</li> </ul>	)
D.梅毒血清檢查 (Serological Test for Syphilis): 檢驗(Tests): a.□RPR 或□VDRL b.□TPHA/TPPA c.□其它 (Other) 判定(Results):□合格(Passed) □不合格(Failed) □兒童 15 歲以下免驗 (Not required for children under 15 years of age)	

E.麻疹及德國麻疹之抗體陽性檢驗報告或預防接種證明 (proof o	f positive measles and rubella antibody	
titers or measles and rubella vaccination certificates):		
a.抗體檢查 (Antibody test ) 麻疹抗體 measles antibody titers □陽性 Positive □[	谷村 Nagativa □ t 水戸 (Equivagel)	
	陰性 Negative □未確定(Equivocal) 陰性 Negative □未確定(Equivocal)	
b.預防接種證明 Vaccination Certificates	去任 Regarive □木曜足 (Equivocal)	
(含接種日期、接種院所及疫苗批號;接種日期與出國日期)	雁至小相隔雨调。)	
(The Certificate should include the date of vaccination, the name		
the batch no. of vaccine; the date of vaccination should be at le		
□麻疹預防接種證明 Vaccination Certificates of Measles		
□德國麻疹預防接種證明 Vaccination Certificates of Rubella	1 I	
c. □經醫師評估,有接種禁忌者,暫不適宜接種。(Having contr	raindications, not suitable for vaccination)	
漢 生 病 檢 查 (EXAMINATION FOR HA	NSEN'S DISEASE )	
全身皮膚視診結果(Skin Examination)		
□正常 Normal		
□異常 Abnormal:○非漢生病 (not related to Hansen's disease		
○漢生病(疑似個案須進一步檢查)(Hansen	's disease suspect needs further exam)	
a.病理切片(Skin Biopsy):		
b.皮膚抹片(Skin Smear): 〇陽性 (Fin		
C.皮膚病灶合併感覺喪失或神經腫大(S		
or enlargement of peripheral nerves ) 判定(Results):□合格(Passed) □不合		
□ 來自特定地區者免驗 (Not required for applicants from design		
備註(Note):	nated areas as described in Note of	
'用 註(INUC)· 一、本表供外籍人士、無戶籍國民、大陸地區人民及香港澳門居民申請在臺灣居留	龙定足時使用。This form is for residence annlication	
二、兒童6歲以下免辦理健康檢查,但須檢具預防接種證明備查(年滿1歲以上者		
6 years old is not necessary to have laboratory examination, but the certificate of v		
get at least one dose of measles and rubella vaccines.		
三、懷孕婦女及兒童12歲以下免接受「胸部X光檢查」;懷孕婦女於產後仍應補照服		
of age are exempted from chest X-ray examination. Pregnant women should under		
四、申請免除胸部 X 光檢查之適用對象:申請人限來自結核病盛行率低於十萬分= 理上不適合進行胸部 X 光檢查之診斷證明書,經行政院衛生署疾病管制局審;		
五、兒童 15 歲以下免接受「HIV 抗體檢查」及「梅毒血清檢查」。 A child under		
HIV or Syphilis.		
六、居住於美國、加拿大、歐洲、紐西蘭、澳洲、日本、南韓、香港、澳門、新力		
生蟲糞便檢查及漢生病檢查。 Applicants living in USA, Canada, Europe, New Zealand, Australia, Japan, South Korea, Hong Kong,		
Macao, Singapore or Israel are not required to undergo a stool examination for para		
七、漢生病檢查為全身皮膚檢查,受檢者可穿著內衣內褲,並由親友或女性醫護人員陪同受檢。檢查時逐步分部位受檢,避免一次脫 光全身衣物,維護受檢者隱私。 Hansen's disease examination refers to careful examination of the entire body surface, which should be		
done with courtesy and respect to the applicant's privacy. During the examination		
accompanied by a friend or female medical personnel. Hospitals or clinics have the		
and the examination should be done step by step. Hence, taking off all clothes at th		
八、根據以上對先生/女 □合格  □不合格 <b>□須進一步檢查</b>	士/小姐之檢查結果為	
□合格 □不合格 □須進一步檢查		
Result : According to the above medical report of Mr./Mrs./Ms	, he/she	
has passed the examination has failed the examination	needs further examination.	
負責醫檢師簽章:	(Name & Signature)	
(Chief Medical Technologist)		
負責醫師簽章.	(Norman ) Connert	
(Chief Physician)	(Name & Signature)	
<b>殿 mù 左 主 ) 茨 立</b>		
醫院負責人簽章. (Superintendent)	(Name & Signature)	
日期 (Date):/ 本證明三個月內有多	效(Valid for Three Months)	

## 附錄:健康檢查證明不合格之認定原則

<ul> <li>人類免疫缺乏病 毒抗體檢查</li> <li>一、人類免疫缺乏病毒抗體檢驗經初步測試,連續二次呈陽性反應者,應以西方墨點法(WB)作確認試驗。</li> <li>二、連續二次(採血時間需間隔三個月)西方墨點法結果皆為未確定者,視為合格。</li> <li>門部X光檢查</li> <li>一、活動性肺結核(包括結核性肋膜炎)視為「不合格」。</li> <li>二、非活動性肺結核(包括結核性肋膜炎)視為「不合格」。</li> <li>二、非活動性肺結核視為「合格」,包括下列診斷情形:纖維化(鈣化)肺結核、纖維化(鈣化)病灶及 肋膜增厚。</li> <li>陽內寄生蟲糞便</li> <li>一、經顯微鏡檢查結果為腸道蠕蟲蟲卵或其他原蟲類如:痢疾阿米巴原蟲(Entamoeba histolytica)、 鞭毛原蟲類,纖毛原蟲類及孢子蟲類者為不合格。</li> <li>二、經顯微鏡檢查結果為人芽囊原蟲及阿米巴原蟲類,如:哈氏阿米巴(Entamoeba hartmanni)、 大腸阿米巴(Entamoeba coli)、微小阿米巴(Endolimax nana)、嗜碘阿米巴(Iodamoeba butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治 療,視為「合格」。</li> <li>三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。</li> </ul>	THE PORT	
<ul> <li>毒抗體檢查 <ul> <li>二、連續二次(採血時間需間隔三個月)西方墨點法結果皆為未確定者,視為合格。</li> </ul> </li> <li>約部X光檢查 <ul> <li><ul> <li>&lt;</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>	檢查項目	不合格之認定原則
<ul> <li>二、連續二次(採血時間需間隔三個月)西方墨點法結果皆為未確定者,視為合格。</li> <li>胸部X光檢查</li> <li>二、活動性肺結核(包括結核性肋膜炎)視為「不合格」。</li> <li>二、非活動性肺結核視為「合格」,包括下列診斷情形:纖維化(鈣化)肺結核、纖維化(鈣化)病灶及肋膜增厚。</li> <li>腸內寄生蟲糞便</li> <li>一、經顯微鏡檢查結果為腸道蠕蟲蟲卵或其他原蟲類如:痢疾阿米巴原蟲(Entamoeba histolytica)、 鞭毛原蟲類,纖毛原蟲類及孢子蟲類者為不合格。</li> <li>二、經顯微鏡檢查結果為人芽囊原蟲及阿米巴原蟲類,如:哈氏阿米巴(Entamoeba hartmanni)、 大腸阿米巴(Entamoeba coli)、微小阿米巴(Endolimax nana)、嗜碘阿米巴(Iodamoeba butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治 療,視為「合格」。</li> <li>三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。</li> <li>梅毒血清檢查</li> <li>一、以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不 合格」:</li> <li>(一)活性梅毒:同時符合條件(二)者。</li> <li>二、條件:</li> <li>(一) 臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(三) 非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>二、條件:</li> <li>(一) 臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(三) 曾經接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA(TPPA)=1:320 以上(含 320)。</li> <li>(三) 曾經接受梅毒治療者,VDRL 償數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹, 虛國麻疹抗體檢查結果為腐陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>	人類免疫缺乏病	一、人類免疫缺乏病毒抗體檢驗經初步測試,連續二次呈陽性反應者,應以西方墨點法(WB)作確
<ul> <li>胸部X光檢查</li> <li>-、活動性肺結核(包括結核性肋膜炎)視為「不合格」。</li> <li>ニ、非活動性肺結核視為「合格」,包括下列診斷情形:鐵維化(鈣化)肺結核、纖維化(鈣化)病灶及肋膜增厚。</li> <li>腸內寄生蟲糞便</li> <li>-、經顯微鏡檢查結果為腸道蠕蟲蟲卵或其他原蟲類如:痢疾阿米巴原蟲(Entamoeba histolytica)、檢查</li> <li>二、經顯微鏡檢查結果為人芽囊原蟲及阿米巴原蟲類,如:哈氏阿米巴(Entamoeba histolytica)、 大腸阿米巴(Entamoeba coli)、微小阿米巴(Endolimax nana)、嗜碘阿米巴(Iodamoeba butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治療,視為「合格」。</li> <li>三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。</li> <li>梅毒血清檢查</li> <li>-、以RPR或VDRL其中一種加上TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不 合格」:</li> <li>(一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。</li> <li>(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>二、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療病,或病皮不清楚者,RPR(+)或VDRL(+),且TPHA(TPPA)=1:320以上(含 320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> </ul>	毒抗體檢查	認試驗。
二、非活動性肺結核視為「合格」,包括下列診斷情形:纖維化(钙化)肺結核、纖維化(钙化)病灶及		二、連續二次(採血時間需間隔三個月)西方墨點法結果皆為未確定者,視為合格。
肋膜增厚。腸內寄生蟲糞便-、經顯微鏡檢查結果為腸道蠕蟲蟲卵或其他原蟲類如:痢疾阿米巴原蟲(Entamoeba histolytica)、 鞭毛原蟲類,纖毛原蟲類及孢子蟲類者為不合格。 二、經顯微鏡檢查結果為人芽囊原蟲及阿米巴原蟲類,如:哈氏阿米巴(Entamoeba hartmanni)、 大腸阿米巴(Entamoeba coli)、微小阿米巴(Endolimax nana)、嗜碘阿米巴(Iodamoeba butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治療,視為「合格」。海藤,視為「合格」。こ、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。一、以RPR或VDRL其中一種加上TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不合格」: (一)活性梅毒:同時符合條件(二)者。 二、條件: (一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。 (二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。 二、條件: (一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。 (三)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或VDRL(+),且TPHA(TPPA)=1:320以上(含 320)。 (三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。 三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。 廠疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防	胸部X光檢查	一、活動性肺結核(包括結核性肋膜炎)視為「不合格」。
<ul> <li>腸內寄生蟲糞便</li> <li>一、經顯微鏡檢查結果為腸道蠕蟲蟲卵或其他原蟲類如:痢疾阿米巴原蟲(Entamoeba histolytica)、 檢查</li> <li>粒毛原蟲類,纖毛原蟲類及孢子蟲類者為不合格。</li> <li>二、經顯微鏡檢查結果為人芽囊原蟲及阿米巴原蟲類,如:哈氏阿米巴(Entamoeba hartmanni)、 大腸阿米巴(Entamoeba coli)、微小阿米巴(Endolimax nana)、嗜碘阿米巴(Iodamoeba butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治 療,視為「合格」。</li> <li>三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。</li> <li>梅毒血清檢查</li> <li>一、以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不 合格」:</li> <li>(一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。</li> <li>(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA(TPPA)=1:320 以上(含 320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹,德國麻疹,聽險性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		二、非活動性肺結核視為「合格」,包括下列診斷情形:纖維化(鈣化)肺結核、纖維化(鈣化)病灶及
<ul> <li> 撤查 <ul> <li> 鞭毛原蟲類,纖毛原蟲類及孢子蟲類者為不合格。</li> <li> 二、經顯微鏡檢查結果為人芽囊原蟲及阿米巴原蟲類,如:哈氏阿米巴(Entamoeba hartmanni)、 大腸阿米巴(Entamoeba coli)、微小阿米巴(Endolimax nana)、嗜碘阿米巴(Iodamoeba butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治 療,視為「合格」。</li> <li> 三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。</li> </ul> </li> <li> 梅毒血清檢查 <ul> <li> <ul> <li> <ul> <li> <li> <ul> <li> <ul> <li> <ul> <li> <li> <ul> <li> <li> <ul> <li> <ul> <li> <ul> <li> <li> <ul> <li> <ul> <li> <ul> <li> <ul> <li> <ul> <li> <ul> <li> <li> <li> <ul> <li> <li> <ul> <li> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></li></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></li></ul></li></ul></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></ul></li></ul></li></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		肋膜增厚。
<ul> <li>二、經顯微鏡檢查結果為人芽囊原蟲及阿米巴原蟲類,如:哈氏阿米巴(Entamoeba hartmanni)、 大腸阿米巴(Entamoeba coli)、微小阿米巴(Endolimax nana)、嗜碘阿米巴(Iodamoeba butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治療,視為「合格」。</li> <li>三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。</li> <li>梅毒血清檢查</li> <li>一、以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不 合格」:</li> <li>(一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。</li> <li>(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>二、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA(TPPA)=1:320 以上(含 320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>	腸內寄生蟲糞便	一、經顯微鏡檢查結果為腸道蠕蟲蟲卵或其他原蟲類如:痢疾阿米巴原蟲(Entamoeba histolytica)、
<ul> <li>大腸阿米巴(Entamoeba coli)、微小阿米巴(Endolimax nana)、嗜碘阿米巴(Iodamoeba butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治療,視為「合格」。</li> <li>三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。</li> <li>本 以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不 合格」:</li> <li>(一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。</li> <li>(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA(TPPA)=1:320 以上(含 320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>	檢查	鞭毛原蟲類,纖毛原蟲類及孢子蟲類者為不合格。
butschlii)、雙核阿米巴(Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治療,視為「合格」。         三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。         梅毒血清檢查         一、以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不合格」:         (一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。         (二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。         二、條件:         (一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。         (二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA(TPPA)=1:320 以上(含320)。         (三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。         三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。         麻疹、德國麻疹,德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防		二、經顯微鏡檢查結果為人芽囊原蟲及阿米巴原蟲類,如:哈氏阿米巴 (Entamoeba hartmanni)、
療,視為「合格」。         三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。         梅毒血清檢查       一、以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不合格」:         (一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。         (二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。         二、條件:         (一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。         (二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA(TPPA)=1:320 以上(含320)。         (三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。         三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。         麻疹、德國麻疹,德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防		大腸阿米巴 (Entamoeba coli)、微小阿米巴 (Endolimax nana)、嗜碘阿米巴 (Iodamoeba
<ul> <li>三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。</li> <li>梅毒血清檢查</li> <li>一、以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不合格」:</li> <li>(一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。</li> <li>(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>二、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA(TPPA)=1:320 以上(含320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹,德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		butschlii)、雙核阿米巴 (Dientamoeba fragilis)、唇形鞭毛蟲(Chilomastix mesnili)等,可不予治
梅毒血清檢查 -、以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不 合格」: (一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。 (二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。 二、條件: (一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。 (二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA(TPPA)=1:320以上(含 320)。 (三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。 三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。 麻疹、德國麻疹 麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防		療,視為「合格」。
<ul> <li>合格」: <ul> <li>(一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。</li> <li>(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>二、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA (TPPA)=1:320 以上(含320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> </ul> </li> <li>麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		三、妊娠孕婦如為寄生蟲檢查陽性者,視為合格;請於分娩後,進行治療。
<ul> <li>(一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。</li> <li>(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>二、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA (TPPA)=1:320 以上(含320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>	梅毒血清檢查	一、以 RPR 或 VDRL 其中一種加上 TPHA(TPPA)之檢驗,如檢驗結果有下列情形任一者,為「不
<ul> <li>(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。</li> <li>二、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA (TPPA)=1:320 以上(含320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		合格」:
<ul> <li>二、條件:</li> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA (TPPA)=1:320 以上(含320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹,德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		(一)活性梅毒:同時符合條件(一)及(二)、或僅符合條件(三)者。
<ul> <li>(一)臨床症狀出現硬下疳或全身性梅毒紅疹等臨床症狀。</li> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA (TPPA)=1:320 以上(含320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹,德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		(二)非活性梅毒:僅符合條件(二)者。
<ul> <li>(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者,RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA (TPPA)=1:320 以上(含320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹,抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		二、條件:
<ul> <li>320)。</li> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹,流體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		
<ul> <li>(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。</li> <li>三、梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</li> <li>麻疹、德國麻疹,德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防</li> </ul>		(二)未曾接受梅毒治療或病史不清楚者, RPR(+)或 VDRL(+),且 TPHA (TPPA)=1:320 以上(含)
三、 <b>梅毒血清檢查陽性者,檢具治療證明,視為合格。</b> 麻疹、德國麻疹,德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防		320) •
麻疹、德國麻疹 麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防		(三)曾經接受梅毒治療者,VDRL 價數上升四倍。
接種證明者,視為不合格。但經醫師評估有麻疹、德國麻疹疫苗接種禁忌者,視為合格。	麻疹、德國麻疹	麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性(或未確定者),且未檢具於抗體檢查後之麻疹、德國麻疹預防
		接種證明者,視為不合格。但經醫師評估有麻疹、德國麻疹疫苗接種禁忌者,視為合格。

## Appendix: Principles in determining the health status failed

Test Item	Principles on the determination of failed items
Serological Test	1. If the preliminary testing of the serological test for HIV antibody is positive for two consecutive times,
for HIV	confirmation testing by WB is required.
Antibody	2. When findings of two consecutive WB testing (blood specimens collected at an interval of three
	months) are indeterminate, this item is considered qualified.
Chest X-ray	1. Active pulmonary tuberculosis (including tuberculous pleurisy) is unqualified.
	2. Non-active pulmonary tuberculosis including calcified pulmonary tuberculosis, calcified foci and
	enlargement of pleura, is considered qualified.
Stool	1. By microscope examination, cases are determined unqualified if intestinal helminthes eggs or other
Examination for	
Parasites	2. Blastocystis hominis and Amoeba protozoa such as Entamoeba hartmanni, Entaboeba coli, Endolimax
	nana, Iodamoeba butschlii, Dientamoeba fragilis, Chilomastix mesnili found through microscope
	examination are considered qualified and no treatment is required.
	3. Pregnant women who have positive result for parasites examination are considered qualified and
	please have medical treatment after the child's birth.
Serological Test	1. After testing by either RPR or VDRL together with TPHA(TPPA), if cases meet one of the following
for Syphilis	situations are considered failing the examination.
	(1)Active syphilis: must fit the criterion $(1) + (2)$ or only the criterion $(3)$ .
	(2)Inactive syphilis: only fit the criterion (2).
	2. Criterion:
	(1)Clinical symptoms with genital ulcers (chancres) or syphilis rash all over the body.
	(2)No past diagnosis of syphilis, a reactive nontreponemal test (i.e., VDRL or RPR), and
	$TPHA(TPPA) = 1 : 320\uparrow(including 1 : 320)$
	(3)A past history of syphilis therapy and a current nontreponemal test titer demonstrating fourfold or
	greater increase from the last nontreponemal test titer.
	3. Those that have failed the serological test for syphilis but have submitted a medical treatment
	certificate are considered passing the examination.
Measles,	The item is considered unqualified if measles or rubella antibody is negative (or equivocal) and no
Rubella	measles, rubella vaccination certificate issued after the antibody test is provided. Those who having
	contraindications, not suitable for vaccinations are considered qualified.